


Session principale 2008 : ©

Le plan est orienté dans le sens direct.

OAB est un triangle rectangle et isocèle tel que $OA = OB$ et $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$.

on désigne par I le milieu du segment [AB] et par C et D les symétriques respectifs du point I par rapport à O et à B.

(Voir figure)



Soit f la similitude directe qui envoie A sur D et O sur C.

1. Montrer que f est de rapport 2 et d'angle $\frac{\pi}{2}$.
2. a) Montrer que O est l'orthocentre du triangle ACD.
b) Soit J le projeté orthogonal du point O sur (AC).

Déterminer les images des droites (OJ) et (AJ) par f et en déduire que J est le centre de la similitude f .

3. Soit g la similitude indirecte de centre I, qui envoie A sur D.
a) Vérifier que g est de rapport 2 et d'axe (IC). En déduire $g(O)$.
b) Déterminer les images de C et D par g ou f^{-1} . En déduire la nature de $g \circ f^{-1}$.
4. Soit $I' = f(I)$ et $J' = g(J)$

- a) Déterminer les images des points J et I' par $g \circ f^{-1}$.
- b) Montrer que les droites (IJ), (I' J') et (CD) sont concourantes.

Session principale 2009 : ©

Dans le plan orienté, on considère un triangle ABC isocèle et rectangle en A tel que $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$.

On désigne par I, J, K et L les milieux respectifs des segments [AB], [BC], [AC] et [JC].

1. Faire une figure
2. Soit f la similitude directe de centre J qui envoie A sur K.
 - a) Déterminer l'angle et le rapport de f.
 - b) Justifier que $f(K) = L$.
 - c) Soit H le milieu du segment [AJ]. Justifier que $f(I) = H$.
3. On munit le plan du repère orthonormé direct $(A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$.


Soit φ l'application du plan dans lui-même qui à tout point M d'affixe z associe le point M' d'affixe z'

$$\text{tel que } z' = -\left(\frac{1+i}{2}\right)\overline{z} + \frac{1+i}{2}$$

- a) Montrer que φ est similitude indirecte de centre C.
- b) Donner les affixes des points I, K, J et H.
- c) Déterminer $\varphi(I)$ et $\varphi(J)$.
- d) Dédire alors que $\varphi = f \circ S_{(IK)}$, (où f est la similitude définie dans 2° et $S_{(IK)}$ est la symétrie orthogonale d'axe (IK)).
4. Soit Δ l'axe de la similitude φ .
 - a) Tracer Δ .
 - b) La droite Δ coupe les droites (IK) et (HL) respectivement en P et Q.

Montrer que $\varphi(P) = f(P)$ et en déduire que $\varphi(P) = Q$.

ABCD est un rectangle de centre O et tel que $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) \equiv \frac{\pi}{6} [2\pi]$. Le point E désigne le symétrique du point A par rapport à D. (Voir figure)



Soit S la similitude directe de centre C, de rapport $\frac{1}{2}$ et d'angle $\frac{\pi}{3}$.

1. a) Justifier que $S(A) = B$.
- b) Montrer que le triangle ACE est équilatéral et en déduire que $S(E) = O$.
2. Soit I un point du segment [EO], distinct des points E et O et soit (Γ) le cercle de centre I et passant par A.

Les droites (AD) et (AB) recourent le cercle (Γ) respectivement en M et P.

- a) Tracer (Γ) et placer les points M et P.
- b) Justifier que le point C appartient à (Γ) .
3. Soit N le projeté orthogonal du point C sur la droite (MP).
 - a) Montrer que $(\overrightarrow{MP}, \overrightarrow{MC}) \equiv \frac{\pi}{6} [2\pi]$.
 - b) En déduire que $S(M) = N$.
4. Montrer que les points B, D et N sont alignés.

Session principale 2008 :

1. f est une similitude directe telle que : $f(A) = D$ et $f(O) = C$.

Soit k le rapport de f et α une mesure de l'angle de f .


$$\text{On a : } k = \frac{DC}{OA} = \frac{2OB}{OA} = 2 \text{ et}$$

$$\alpha \equiv (\overrightarrow{AO}, \overrightarrow{DC})[2\pi] \equiv (\overrightarrow{AO}, 2\overrightarrow{BO})[2\pi] \equiv (\overrightarrow{AO}, \overrightarrow{BO})[2\pi] \equiv (\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB})[2\pi] \equiv \frac{\pi}{2}[2\pi].$$

2. a) $(AO) \perp (OB)$ et $(OB) \parallel (CD) \Rightarrow (AO) \perp (CD)$

$$(CO) = (OI) \perp (AB) = (AD)$$

$\Rightarrow O$ est l'orthocentre du triangle ACD .



b) $f(OJ)$ est la perpendiculaire à (OJ) passant par $f(O) = C \Rightarrow f(OJ) = (AC)$

$f(AJ)$ est la perpendiculaire à (AJ) passant par $f(A) = D \Rightarrow f(AJ) = (DJ)$

$J \in (OJ) \cap (AJ) \Rightarrow f(J) \in (AC) \cap (DJ) \Rightarrow f(J) = J \Rightarrow J$ est le centre de f .

3. g est la similitude indirecte telle que $g(I) = I$ et $g(A) = D$

a) Soit k' le rapport de $g \Rightarrow k' = \frac{ID}{IA} = \frac{2IB}{IA} = 2$

Soit Δ l'axe de $g \Rightarrow \Delta$ est la bissectrice intérieure de $(\overline{IA}, \overline{ID}) \Rightarrow \Delta = (IC)$.

$g(O) = h_{(I,2)} \circ S_{(IC)}(O) = h_{(I,2)}(O) = C$.

b) $g \circ f^{-1}(C) = g(O) = C$ et $g \circ f^{-1}(D) = g(A) = D$

$g \circ f^{-1}$ est une similitude indirecte qui fixe deux points distincts C et $D \Rightarrow g \circ f^{-1}$ est un antidéplacement qui fixe C et $D \Rightarrow g \circ f^{-1} = S_{(CD)}$.

4. $I' = f(I)$ et $J' = g(J)$

a) $g \circ f^{-1}(J) = g(J) = J' = S_{(CD)}(J)$

$g \circ f^{-1}(I') = g(I) = I = S_{(CD)}(I')$

$S_{(CD)}(IJ) = (I'J')$; (IJ) et (CD) sont sécantes en un point ω car si non :

On aura $(IJ) \parallel (CD)$ et $(JJ') \perp (CD) \Rightarrow (IJ) \perp (JJ')$.


De plus on a : $f(I) = I'$ et $f(J) = J \Rightarrow (IJ) \perp (I'J)$.

$\Rightarrow (JJ') \parallel (I'J) \Rightarrow J, I'$ et J' sont alignés, ce qui n'est pas le cas $\Rightarrow (I'J)$ et (CD) sont sécantes en ω

Ainsi (IJ) , (CD) et $(I'J)$ sont sécantes en ω .

Session principale 2009 :

1. Figure



2. f la similitude directe telle que $f(J) = J$ et $f(A) = K$.

a) Soit k le rapport de f et α une mesure de l'angle de f .

$$\alpha \equiv (\widehat{JA, JK})[2\pi] \equiv -\frac{\pi}{4}[2\pi]$$

$$k = \frac{JK}{JA} = \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

b) Le triangle LKJ est rectangle et isocèle en L tel que $(\widehat{LK, LJ}) \equiv \frac{\pi}{2}[2\pi]$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{JL}{JK} = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ (\widehat{JK, JL}) \equiv -\frac{\pi}{4}[2\pi] \end{cases} \Rightarrow f(K) = L.$$

c) Le triangle HIJ est rectangle et isocèle en H tel que $(\widehat{HI, HJ}) \equiv \frac{\pi}{2}[2\pi]$

$$d) \Rightarrow \begin{cases} \frac{JH}{JI} = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ (\widehat{JI, JH}) \equiv -\frac{\pi}{4}[2\pi] \end{cases} \Rightarrow f(I) = H.$$

3. $\varphi : M(z) \rightarrow M'(z')$ tel que : $z' = -\left(\frac{1+i}{2}\right)\bar{z} + \frac{1+i}{2}$

a) $z' = a\bar{z} + b$, où $a \in \mathbb{C}^*$ et $b \in \mathbb{C} \Rightarrow \varphi$ est une similitude indirecte de rapport

$$|a| = \left| -\left(\frac{1+i}{2}\right) \right| = \frac{\sqrt{2}}{2} \neq 1 \text{ et de centre } \omega \text{ d'affixe}$$

$$\frac{a\bar{b} + b}{1 - |a|^2} = \frac{-\left(\frac{1+i}{2}\right) \times \left(\frac{1-i}{2}\right) + \left(\frac{1+i}{2}\right)}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{-\frac{1}{2} + \left(\frac{1+i}{2}\right)}{\frac{1}{2}} = i = z_C \Rightarrow \omega = C.$$

b) $z_I = \frac{1}{2}$, $z_K = \frac{1}{2}i$, $z_J = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$ et $z_H = \frac{1}{4} + \frac{1}{4}i$.

c) Soit $\varphi(I) = I' \Rightarrow z_{I'} = -\left(\frac{1+i}{2}\right)\bar{z}_I + \frac{1+i}{2} = -\left(\frac{1+i}{2}\right) \times \frac{1}{2} + \frac{1+i}{2} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4}i = z_H \Rightarrow \varphi(I) = H.$

Soit $\varphi(J) = J' \Rightarrow z_{J'} = -\left(\frac{1+i}{2}\right)\bar{z}_J + \frac{1+i}{2} = -\left(\frac{1+i}{2}\right) \times \left(\frac{1-i}{2}\right) + \frac{1+i}{2} = \frac{1}{2}i = z_K \Rightarrow \varphi(J) = K.$

d) $f \circ S_{(IK)}$ est une similitude indirecte telle que :

$$f \circ S_{(IK)}(I) = f(I) = H = \varphi(I) \text{ et } f \circ S_{(IK)}(J) = f(A) = K = \varphi(J)$$

$f \circ S_{(IK)}$ et φ sont deux similitudes indirectes qui coïncident sur deux points distincts I et J donc

$f \circ S_{(IK)}$ et φ sont identiques.

4. Δ est l'axe de la similitude φ

a) $\varphi(C) = C$ et $\varphi(J) = K \Rightarrow \Delta$ est la bissectrice intérieure de l'angle $(\overrightarrow{CJ}, \overrightarrow{CK})$. (Voir figure)

b) $\varphi(P) = f \circ S_{(IK)}(P) = f(P)$

$$P \in \Delta \Rightarrow \varphi(P) \in \varphi(\Delta) \Rightarrow \varphi(P) \in \Delta$$

$$P \in (IK) \Rightarrow \varphi(P) = f(P) \in f((IK)) = (HL)$$

$$\Rightarrow \varphi(P) \in \Delta \cap (HL) \Rightarrow \varphi(P) = Q$$


Session de contrôle 2009 :

1. S la similitude directe telle que : $S(C) = C$, de rapport $\frac{1}{2}$ et d'angle $\frac{\pi}{3}$: $S = S_{\left(c, \frac{1}{2}, \frac{\pi}{3}\right)}$.

a) $\frac{CB}{CA} = \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$ et $(\widehat{CA, CB}) \equiv \frac{\pi}{3} [2\pi] \Rightarrow S(A) = B$.

b) $AE = 2AD$ et $AC = \frac{AD}{\sin \frac{\pi}{6}} = 2AD \Rightarrow AE = AC$, de plus on a : $(\widehat{AC, AE}) \equiv \frac{\pi}{6} [2\pi] \Rightarrow ACE$ est équilatéral.

2. a) Voir figure



b) $I \in (EO) = \text{méd}[AC] \Rightarrow IA = IC \Rightarrow C \in (\Gamma)$.

3. a) $(\overrightarrow{MP}, \widehat{MC}) \equiv (\overrightarrow{AP}, \widehat{MC})[2\pi] \equiv \frac{\pi}{6}[2\pi]$ (car M et A appartiennent au même arc orienté \widehat{CP})

b) Le triangle NCM est rectangle en N tel que : $(\overrightarrow{MN}, \widehat{MC}) \equiv (\overrightarrow{MP}, \widehat{MC})[2\pi] \equiv \frac{\pi}{6}[2\pi]$

$$\Rightarrow \frac{CN}{CM} = \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2} \text{ et } (\overrightarrow{CM}, \widehat{CN}) \equiv \frac{\pi}{3}[2\pi] \Rightarrow S(M) = N.$$

4. $S(A) = B$; $S(M) = N$; $S(E) = D$ et A, M et E sont alignés \Rightarrow B, N et D sont alignés

(N. B : $S(E) = D$ car DEC est un triangle rectangle en D et $(\overrightarrow{CE}, \widehat{CD}) \equiv \frac{\pi}{6}[2\pi]$).