

afif ben ismail	<u>Devoir de contrôle N°1</u>	http://afimath.jimdo.com/
	<u>Mathématiques</u> <u>durée 2h</u>	<u>4^{ème} SC exp1+2</u> <u>Le 03/11/2007</u>

EXERCICE N°1(5pts)

Dans le plan complexe on considère le point M d'affixe z , $z \neq -2i$ et on pose

$$Z' = \frac{z - 2 + i}{z + 2i}$$

- 1)** Si $z = x + iy$, $(x, y) \in \mathbb{R}^2$; donner la forme algébrique de Z' en fonction de x et y
- 2)** Déterminer l'ensemble E des points M tel que $Z' \in \mathbb{R}$
- 3)** Déterminer l'ensemble F des points M tel que $Z' \in i\mathbb{R}$
- 4)** Déterminer l'ensemble G des points M tel que $|Z'| = 1$
- 5)** Soit A le point d'affixe $z_A = -2i$.

Montrer que si M décrit le cercle de centre A et de rayon $\sqrt{5}$ le point M' (Z') varie sur un cercle que l'on précisera. (Vérifier que z s'écrit $z = -2i + \sqrt{5} e^{i\alpha}$, $\alpha \in [0, 2\pi[$)


EXERCICE N°2 (5pts)

On considère dans \mathbb{C} l'équation (E) : $Z^2 - 2Z + 1 - e^{2i\theta} = 0$

- 1)** Résoudre l'équation (E) dans \mathbb{C} .
- 2)** Soit $\theta \in]0, \pi[$ on donne $Z_1 = 1 + \cos\theta + i\sin\theta$ et $Z_2 = 1 - \cos\theta - i\sin\theta$
Ecrire Z_1 et Z_2 sous forme trigonométrique.
- 3)** On considère dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct les points M_1 et M_2 d'affixes respectives Z_1 et Z_2
 - a)** Calculer Z_1/Z_2 et en déduire que le triangle OM_1M_2 est rectangle en O.
 - b)** Déterminer θ pour que le triangle OM_1M_2 soit isocèle.
 - c)** Montrer que si θ décrit $]0, \pi[$, le point M_1 varie sur un cercle (C) que l'on précisera. (Tracer (C) et préciser cet ensemble).

EXERCICE N°3 (6pts)

- 1) a) Montrer que l'équation (E) : $X^3 + X^2 + X - 2 = 0$ admet une solution $\alpha \in]0, 1[$
 - b) Montrer que la fonction $f : X \mapsto X^3 + X^2 + X - 2$ est strictement croissante sur l'intervalle $[0, 1]$.
 - c) En déduire que l'équation (E) admet une solution unique dans $]0, 1[$
 - d) Trouver un encadrement d'amplitude 0,25 de cette solution.
- 2) Dans la figure, ζ est un cercle de rayon 1, X est un réel de l'intervalle $[0, \pi/2[$
 - a) Exprimer en fonction de X la longueur de chacun des trajets OAB (en trait fort sur la figure) et AC.
 - b) Montrer qu'il existe une unique valeur X_0 de $]0, \pi/2[$ pour laquelle les deux trajets ont la même longueur.



EXERCICE N°4 (4pts)

On considère la fonction f définie par :
$$f(x) = \begin{cases} -x + \sqrt{x+1} & \text{si } x \geq -1 \\ \frac{-|x|^3 + x^2}{x+1} & \text{si } x < -1 \end{cases}$$

- 1) Calculer les limites de f en $(-\infty)$ et en $(+\infty)$
- 2) Etudier la continuité de f en (-1) .
- 3) Etudier la dérivabilité de f en (-1) .
- 4) Déterminer le domaine de dérivabilité de f et donner sa fonction dérivée.